



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАУФОН TAUFON

**Торговое название препарата:** Тауфон

**Действующее вещество (МНН):** таурин

**Форма выпуска:** капли глазные. По 5 мл или 10 мл во флаконе. По 1 флакону в пачке.

**Состав:**

1 мл препарата содержит:

*Активное вещество:* таурин 40 мг;

*Вспомогательные вещества:* метилпарагидроксибензоат (Е 218), вода для инъекций.

*Описание:* прозрачная бесцветная жидкость.

**Фармакотерапевтическая группа:** Средства, преимущественно применяемые в офтальмологии. Средства против катаракты.

**Код АТХ:** S01X A.

### Фармакологические свойства

Тауфон относится к препаратам аминокислот, которые стимулируют репаративные и регенерационные процессы при заболеваниях сетчатки глаза дистрофического характера, травматических поражениях глаза, патологических процессах, которые сопровождаются резким нарушением метаболизма этих тканей. Как соединение, содержащее серу, препарат способствует нормализации функций клеточных мембран, оптимизации энергетических и обменных процессов, поддержанию постоянства электролитного состава цитоплазмы клеток, торможению синаптической передачи (нейромедиаторная роль).

### Фармакокинетика

При закапывании Тауфон проникает в ткани глаза, где и оказывает свое специфическое действие. При применении в терапевтических дозах препарат практически не всасывается в системный кровоток.

### Показания к применению

Дистрофические поражения роговицы и сетчатки глаза, включая наследственные тапеторетинальные дегенерации; старческие, диабетические, травматические и лучевые катаракты; как средство стимуляции репаративных процессов при травмах роговицы; как дополнительное средство при лечении открытоугольной глаукомы.

### Способ применения и дозы

Тауфон назначают взрослым.

*Для лечения катаракты* назначают по 2-3 капли 2-4 раза в день. Курс лечения – 3 месяца.

Курс повторить с интервалом в 1 месяц.

*При травмах* применять по 2-3 капли 2-4 раза в день на протяжении 1 месяца.

Для лечения тапеторетинальной дегенерации и других дистрофических заболеваний сетчатки, проникающих травм роговицы препарат вводят под конъюнктиву по 0,3 мл 4% раствора 1 раз в день на протяжении 10 дней. Курс лечения повторить через 6-8 месяцев. При открытоугольной глаукоме Тауфон закапывают по 2-3 капли в конъюнктивальный мешок 2 раза в день за 20-30 минут до применения тимолола. Курс лечения определяется индивидуально.

#### **Побочные действия**

Препарат, как правило, хорошо переносится. У отдельных пациентов возможно развитие аллергических реакций, гиперемии конъюнктивы, зуда, жжения и рези в глазах.

#### **Противопоказания**

Гиперчувствительность к компонентам препарата. Детям и подросткам до 18 лет. Беременность и период лактации.

#### **Лекарственные взаимодействия**

При совместном применении с глазными каплями тимолола наблюдается потенцированное снижение внутриглазного и артериального давления.

#### **Особые указания**

При открытоугольной глаукоме препарат применяют в сочетании с тимололом за 20-30 минут до закапывания тимолола.

*Применение в период беременности или кормления грудью.*

Эффективность и безопасность применения в период беременности или кормления грудью не исследовались.

*Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами.* Не изучалась.

*Дети.* Эффективность и безопасность применения детям не исследовались.

Препарат не следует применять после истечения срока годности и следует хранить в недоступном для детей месте.

#### **Передозировка**

Случаи передозировки не описаны.

#### **Условия хранения**

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 8°C до 15°C.

#### **Срок годности**

3 года.

#### **Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

#### **Производитель**

ПАО «Фармак».

Украина, 04080, г. Киев, ул. Фрунзе, 63.