

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТАУФОН

Торговое название препарата: Тауфон

Действующее вещество (МНН): таурин (taurine)

Лекарственная форма: капли глазные

Состав:

1 мл препарата содержит:

активное вещество: таурина 40 мг;

вспомогательные вещества: метилпарагидроксибензоат (Е 218), вода для инъекций.

Описание: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа: Органы чувств. Препараты, применяемые в офтальмологии. Другие препараты применяемые в офтальмологии.

Код АТХ S01XA

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Тауфон относится к препаратам аминокислот, которые стимулируют репаративные и регенерационные процессы при заболеваниях сетчатки глаза дистрофического характера, травматических поражениях глаза, патологических процессах, которые сопровождаются резким нарушением метаболизма этих тканей. Как соединение, содержащее серу, препарат способствует нормализации функций клеточных мембран, оптимизации энергетических и обменных процессов, поддержанию постоянства электролитного состава цитоплазмы клеток, торможению синаптической передачи (нейромедиаторная роль).

Фармакокинетика

При закапывании Тауфон проникает в ткани глаза, где и оказывает свое специфическое действие. При применении в терапевтических дозах препарат практически не всасывается в системный кровоток.

Показания к применению

Дистрофические поражения роговицы и сетчатки глаза, включая наследственные тапеторетинальные дегенерации; старческие, диабетические, травматические и лучевые катаракты; как средство стимуляции репаративных процессов при травмах роговицы; как дополнительное средство при лечении открытоугольной глаукомы.

Способ применения и дозы

Препарат назначают взрослым.

Вскрытие флакона производится путем прокола верхней части горловины поворотом колпачка до упора.

Непосредственно перед применением желательно подержать флакон с препаратом в ладони, чтобы подогреть его до температуры тела. Закапывать по 2 – 3 капли 2 – 4 раза в сутки в конъюнктивальный мешок пораженного глаза.

Курс лечения при травмах – 1 месяц, при катарактах – 3 месяца (повторять с интервалом 1 месяц).

Для лечения тапеторетинальной дегенерации и других дистрофических заболеваний сетчатки, проникающих ран роговицы препарат вводят под конъюнктиву: по 0,3 мл 4 % раствора 1 раз в сутки в течение 10 дней. Курс повторяют через 6 – 8 месяцев.

При открытоугольной глаукоме инстиллируют 2 – 3 капли в каждый конъюнктивальный

мешок 2 раза в день за 20 – 30 минут до применения тимолола. Курс лечения определяют индивидуально.

Побочные действия

При применении препарата могут возникнуть аллергические реакции в виде аллергического конъюнктивита, вызванные индивидуальной гиперчувствительностью к компонентам препарата.

Нарушения со стороны органов зрения: зуд глаз, гиперемия конъюнктивы, раздражение глаза (рези и жжение в глазах).

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Лекарственные взаимодействия

При одновременном применении с глазными каплями тимолола наблюдается потенцированное снижение внутриглазного давления, а также потенцированное снижение артериального давления.

Особые указания

При открытоугольной глаукоме препарат применяют в сочетании с тимололом за 20 – 30 минут до закапывания тимолола.

Вспомогательные вещества

Лекарственное средство содержит метилпарагидроксibenзоат (Е 218), что может вызвать аллергические реакции (возможно замедленные).

Ограничения к применению пациентов детского возраста

Данные по эффективности и безопасности лекарственного средства у детей и подростков в возрасте до 18 лет отсутствуют. Поэтому не следует назначать препарат этой возрастной категории пациентов.

Применение при беременности и в период лактации

Данных о применении препарата в период беременности или кормления грудью нет.

Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами

Действие препарата на организм человека во время управления автотранспортом или при работе с другими механизмами не изучалось.

Передозировка

Данных о передозировке препарата нет.

Форма выпуска

По 10 мл во флаконе. По 1 флакону вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от света при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Срок годности препарата после вскрытия флакона – 28 суток.

Не применять препарат после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

АО «Фармак». Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

Информация об организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан

Представительство АО «Фармак» в Узбекистане.

Республика Узбекистан, 100170, г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, ул. Зиёлилар 12а, 1/2

Тел.: +998 (55) 512-77-13

e-mail: info@farmak.ua