



## ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПЕКТОЛВАН® ПЛЮЩ

**Торговое название препарата:** Пектолван® плющ

**Действующее вещество (МНН):** плюща обыкновенного листьев экстракта сухого

**Лекарственная форма:** капсулы

**Состав:**

1 капсула содержит:

**активное вещество:** 52,5 мг плюща обыкновенного листьев экстракта сухого (*Hederae heliсis e folium*) ((4–8):1) (экстрагент этанол 30 %);

**вспомогательные вещества:** целлюлоза микрокристаллическая, мальтодекстрин, крахмал кукурузный, коповидон, магния стеарат;

**состав оболочки капсулы:** желатин, титана диоксид (Е 171), железа оксид желтый (Е 172), индиготин (Е 132).

**Описание:** твердые желатиновые капсулы № 3, корпус капсулы и крышечка – темно-зеленого цвета. Содержимое капсулы – порошок светло-коричневого цвета, содержащий небольшие частицы от светлого до более темного цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** средства, применяющиеся при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

**Код АТХ:** R05CA

### Фармакологические свойства

#### Фармакодинамика

Лекарственное средство растительного происхождения. В его состав входит сухой экстракт листьев плюща, который оказывает противокашлевое, отхаркивающее, спазмолитическое, противовоспалительное, антимикробное действие, которое обусловлено наличием гликозидов (сапонинов).

Уменьшает вязкость мокроты, облегчает ее отхождение.

#### Фармакокинетика

Не изучалась.

### Показания к применению

- Острые воспалительные заболевания дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем.
- Симптоматическое лечение хронических воспалительных заболеваний бронхов.

### Способ применения и дозы

Взрослым и детям старше 12 лет – по 1 капсуле 3 раза в сутки.

Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально в зависимости от типа и тяжести симптомов. В легких случаях длительность лечения составляет 1 неделю. Если улучшение состояния пациента не наступает, следует обратиться к врачу относительно дальнейшего лечения.

### Побочные действия

Могут наблюдаться аллергические реакции: одышка, отек Квинке, сыпь на коже, крапивница, зуд. Частота неизвестна.

У пациентов с повышенной чувствительностью могут наблюдаться желудочно-кишечные нарушения, включая тошноту, рвоту, диарею, боль в животе.

### **Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к активному веществу, растениям семейства аралиевых или любому другому компоненту лекарственного средства.

### **Лекарственные взаимодействия**

При одновременном применении препарата Пектолван® Плющ и других лекарственных средств побочного действия препарата не наблюдалось. Поэтому препарат Пектолван® Плющ можно применять вместе с другими лекарственными средствами, например, с антибиотиками. Сопутствующее применение средств от кашля, таких как кодеин или декстрометорфан, без медицинской консультации, не рекомендуется.

### **Особые указания**

Длительный или рецидивирующий кашель у детей требует медицинского диагностирования перед лечением.

Если симптомы заболевания не исчезают или появляется одышка, лихорадка, а также гнойная или кровавая мокрота при отхаркивании, следует немедленно проконсультироваться с врачом.

Осторожно применять препарат пациентам с гастритом или язвенной болезнью желудка.

Это лекарственное средство содержит небольшое количество этанола (алкоголя), менее 100 мг/дозу.

Суточная доза капсул Пектолван® Плющ (3 капсулы) содержит 0,00675 ХЕ, что нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом.

### **Ограничения к применению пациентов детского возраста**

Препарат Пектолван® Плющ можно применять детям с 12 лет.

*Применение при беременности и в период кормления грудью*

Из-за отсутствия достаточных данных не рекомендуется применять препарат в период беременности или кормления грудью.

### ***Влияние на способность управлять автомобилем и сложными механизмами***

Лекарственное средство не влияет на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

### **Передозировка**

Не превышать рекомендуемую суточную дозу. Прием препарата в больших количествах, превышающие рекомендованные, может вызвать тошноту, рвоту, диарею или ажитацию. Лечение симптоматическое.

### **Форма выпуска**

По 10 капсул в блистере. По 3 блистера вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке.

### **Условия хранения**

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

### **Срок годности 2 года.**

Не следует применять после истечения срока годности.

### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**Производитель**

АО «Фармак». Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 63.

**Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности**

Украина, 04080, г. Киев, ул. Кирилловская, 74.

**Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:**

*Представительство АО «Фармак» в Узбекистане*

100170 Республика Узбекистан, г.Ташкент, Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Зиелилар 12а, 1/2

Тел.: +998 (71) 235-77-13; e-mail: [info@farmak.ua](mailto:info@farmak.ua)